* اليوم الثالث من الاسعافات *

اختناق

١	٢
جزئي	**كلي**
الحضن	تنفس اصطناعي
اقل مدة	

اسالفي ؛ تعرف المسافة بين الحجاب الحاجز والسرة

ضغط ؛ " " بصورة اقل قوة

اقل مدة ؛ بين $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{١}{٣}$ من عظمة لوح الكتف

نزيف داخلي

حرارة - كدمات - **تورم**

[illegible]

[illegible]

شعيرات

مفتوحة

نزيف قليل

نزيف من ناحية او من ناحيتين

اوردة

كبيرة

نزيف كثير

← تميل راسك قدام بسيطة واضغط 5 دقايق على المنطقة الطرية في الانف والطفل يتنفس من بقه ثم 5 تاني لو استمر ثم 5 تاني اما لو كان مستمر هنحط حتة تلج على الحتة الغضروفية اللي تحت فارس النظارة مباشرة

لو ممكن استخدم امبول الادرينالين احطه على قطنة وكدا واحطها في الانف والادرينالين دا بيعمل انقباض للاوعية الدموية فبيوقف النزيف

← لو نزيف الانف دخل المعدة وكدا عادي اما لو رجعنا راسه لورا دا اكبر غلط

← لو نزيف شديد الانسان ممكن يدخل فيما يسمى بالصدمة

دا ممكن يموته

انت بترجع الدم للقصبة والرئة

الراجل هيموت لعدل راسه لقدام

علشان غلطة انسان

الجروح والنزيف

- ماء - قطن - بيتادين - بلاستر

الجروح ← واحد اتجرح "لا يا راجل"
← جرح بسيط اناو ماشي اتصورت (اتصورت ليس معنيش نزيف)
← جرح متوسط
← جرح بجسم مدبب بابه حاجة تدخل جوة الجسم زي المسمار

العملية ← ① غسيل الجرح ثم بيتادين او كحول ثم بلاستر، قطن
← ② الجرح النازف

النزيف ٣ انواع شعيرى — شعيرات دموية في الجسم ع الجلد مثلاً (نزيفها قليل)
شرياني — قطع شرياني (دم كثير، لونه فاتح)
وريدي — (الساعة مش بيجي كثير لكن كمية كبيرة)

خطير جداً
لو استمر 2 ساعة
هيسبب صدمة
ثم وفاة
مش ابتسام

نضغط بايد على مكان النزيف
، برفع العضو عكس الجاذبية الارضية يعني علشان الدم يقل وميروحش
، نضغط على الشريان المغذي لمكان القطع

جرح بجسم مدبب — مطواة، سكينة، ...

← غلط انك تشيله لانك قد تقطع عصب او وريد
الصح ثبت الجسم في مكانه ومتخلهوش يتحرك
المفروض تلف حواليه بحيث متحركش الجسم ..

ونمسح الاحتياجات لوضع الاسيه لموجه لو الناس لعوق علشان تقلل

كمية النزيف

← النزيف الداخلي ← نزيف محتوياته محجوبه ولا حاجة والدم ده مبيطلعش بره بيسبب صداع او دوخة او اغماء ويتجمع في مكانه

وبيسبب كدمه او رضه ...

العلاج ← الاسعاف

← الكدمات كيس تلج ، كيس جل

لمون معيد البكتريا ← ... ونة

تشنجات

الصرع ← خلل في الاتصالات الكهربية اللي بيبعتها المخ للاعصاب .

بتحدث نتيجة صداع ، ... ، التهابات وخلايا المخ

ودي بيكون فيها مرحلة انقباض لجميع عضلات الجسم تستمر لـ 5 دقايق

الحركة بأني احط حاجة طرية تحت راسه علشان ميتخبطش

محاولش افتح بقه لو مفتوح احاول اظبطه بنفس فتحته

اعمل تنفس صناعي بالوسيلة في الانف

استعمل اي حاجة لو في ايده بسرعة

في مرحلة الارتخاء اوفرله الوسيلة للتنفس

← في الصرع الانسان بيكون مدرك ومتابع وسامع على طول بس مش قادر يتحرك
← هو انقباضات ثم انبساطات متكررة
← هو عرض لمرض
← لا تربط اي مريض في الانقباض او الانبساط عشان 5 دقايق

الصدمة: لو فيه نزيف داخلي "تجمع للدم جوه الجسم"
ومن اعراض الحالة اللي فيها صدمة: كبر الكلية، جهاز
لون الجسم شاحب
النفس سريع، غير منتظم
النبض سريع، ضعيف

الكسور
← هناك نوعين من الجزعة، الكسور للذراع.
← كسر كلي في العظمة ، كسر مركب
كسر حتة صغيرة
← فيه منه نوعين كسر مفتوح ، مغلق
↓
فتح الجلد وخرج للبره
التعامل معاه كمسعف اني اثبته وانقله للمستشفى

التسمم ، اللدغ ، حوادث الطرق

← لو الواحد اكل اكلة بايظة مغص وعصبية في العين وبعض الاسهال
احوال الاسهال وغثيان دا يبقى تسمم غذائي

← اتصل بالاسعاف ولحد ما توصل انت تشربه مايه بملح وده غسيل معده
هيرجع فهيرجع الاكل ده
ولتشوف علامات الحيوية بقياس النبض ،

← ممكن الطفل يشرب البوتاس وده مادة كاوية فالانسجة من الفم لحد
المعدة هتتقيح
الحل تشربه ماء علي قد ما تقدر + اللبن بيعمل عشان بيعمل تبطين للانسجة

← شرب مادة غريبة
← الحل انك تشربه ماء فقط

اللدغات

لدغة ثعبان / عقربة

← تعقيم الا بتفتح بجرح ، غيرها مش هيتفتح (ده الاخطر)

← بعد اللدغة هدأ المريض ثم هنربط رباطة قبل وبعد مكان اللدغة
والمفروض اول ٢٠-٦٠ ثانية اسيبه ينزل دم عادي ومنشفطوش بالفم
ثم اغسله بالمايه

لو مفيش نزيف المفروض نعمل رباط قبل وبعده ونتصل بالاسعاف

فريق وعي المركزي بسوهاج

حوادث الطرق

• افتح باب العربية - راعي النبض، التنفس، مجرى الهواء
متحاولش تطلعه لحسن مثلا ايده تكون مكسورة
تكون سببا بشكل ده تجيبله شلل كلي من قطع الحبل الشوكي في الفقرات
شيل - . * اهم حاجة - الفقرات العنقية متتحركش"